



Epilepsie bij uw hond .

Wat is epilepsie? Is epilepsie een syndroom dat resulteert in de opeenvolging van aanvallen ..

Wat is een aanval ? Epileptische aanvallen worden veroorzaakt door neurologische aandoeningen en niet-gecontroleerde gelijktijdige activiteiten van een meer of minder belangrijk om hersencellen. Ze verschijnen als plotselinge en intermitterende crises waarbij een verschillende mate van onwillekeurige bewegingen , zoals ongecontroleerde val van de hond , fietsen, kwijlen, plassen en ontlasten, de uitstoot van ontlasting of urine , en verminderde of totaal verlies van het bewustzijn. De oorsprong van deze crises is variabel en worden veroorzaakt door elke situatie van neuronale disfunctie.

Hoe zich te gedragen in een crisis, wat moet ik doen ? Tijdens een crisis is het belangrijk om de veiligheid van alle personen te waarborgen , met inbegrip van je. Uw huisdier moet worden geplaatst op de vloer valt , iets dat kan hem pijn moet worden verwijderd , en een zekere afstand moet worden gehouden met de mond van het dier om het risico te worden gebeten door ongelukken te voorkomen voorkomen.

Verminder -up van alle omringende prikkels zoals licht, geluid , kreten van schreeuw om hulp die zo nutteloos. Kinderen moeten éloigés hond met zijn tijd van crisis. Liefkozingen en kalme woorden kunnen worden uitgesproken in de hond mag niet worden gehandhaafd door gedwongen zelfbeheersing. Na een crisis om uw hond stilte en rust te houden. Het is essentieel dat je hond is goed hersteld van de crisis en is in staat om recht op alvorens hem te drinken of om verstikking te voorkomen dat tijdens het slikken eten.

En na ? Moet ik naar mijn dierenarts nood of kan het wachten voor een afspraak later? Als dit de eerste crisis van het dier voor onderzoek en de naaste oorzaak door een dierenarts is van essentieel belang . De gevolgen van een inbeslagneming zijn kleine voor uw huisdier . Zoals tegen de gevolgen van langdurige of herhaalde aanvallen vaak kan leiden tot ernstige neurologische complicaties en zelfs overlijden.

Je hond moet een spoedbehandeling in gevallen waarin zij luidt als volgt: Een aanval duurt dat meer dan vijf minuten . Drie aanvallen , of meer , op dezelfde dag . Status epilepticus Dit soort zaken vergt een spoedbehandeling. Uw dierenarts moet onmiddellijk worden gemeld , zodat het kan de ernst van de conditie van uw huisdier te beoordelen.

Het vervoer van uw huisdier : Transport van uw hond mag niet alleen worden gedaan, maar met ten minste een tweede om te kijken achter hem aan en zorg ervoor dat het geen pijn doet of gewond raakt de bestuurder. Het is raadzaam om uw hond in een stabiele positie , of om een deken of kussen om hem heen toe te voegen. Een vochtige doek kan worden geplaatst op het lichaam tot een verhoging van de temperatuur te beperken. Bij de dierenarts , zal uw hond het vaakst in het ziekenhuis tot en met controle van de aanvallen . Afhankelijk van de conditie van het dier , uw dierenarts is de enige rechter om te beslissen hoe het verder moet .

Waarschuwing : Wij adviseren tegen het maken van fokken met een hond met epilepsie, met het oog op erfelijke epilepsie voorkomen bij puppies !!!!!!!!!!!!!

Conclusie Ondanks de alarmerende symptomen , epilepsie met een milde of meer uitgesproken , gevolgd door een permanente behandeling echter , kan de hond een normaal leven en heel oud geworden .

