



## **Attention : Beaucoup de chiens atteints de “ La toux de chenil ”**

La toux de chenil (ou trachéo-bronchite infectieuse) est une **maladie des voies respiratoires du chiot et du chien**, atteignant principalement les animaux vivant en collectivité (élevages, refuges...). Elle est due à plusieurs agents: **bactéries et virus associés**.

**La contamination se fait par contact avec un chien malade et par les aérosols (postillons) dus à la toux. Le chien développe la maladie 5 à 10 jours après l'exposition aux microbes.**

### **Les symptômes**

- Essentiellement une **toux sèche, forte et quinteuse**. On a souvent l'impression que le chien veut cracher quelque chose. L'état général est souvent atteint et la fièvre est fréquente.
- On peut observer également une **conjonctivite** (œil rouge) et des **écoulements par le nez et les yeux**.
- Des **complications bactériennes** sont enfin possibles: forte fièvre, chien plus abattu, toux devenant grasse, la maladie évolue alors en bronchopneumonie, qui peut être mortelle chez les chiots.

### **Le traitement**

Il est **long: au minimum une dizaine de jours**. La toux a tendance à s'auto-entretenir: certains cas anciens nécessitent jusqu'à trois semaines de traitement.

Le vétérinaire utilise une combinaison d'antibiotiques, d'anti-tussifs et d'anti-inflammatoires.

### **La prévention**

**Plusieurs vaccins existent** contre les différents agents de la toux de chenil. La protection n'est pas efficace à 100% mais permet d'atténuer considérablement les symptômes de la maladie.

Nous vous conseillons de vacciner votre compagnon. Cela peut être fait dès l'âge de 6 semaines sous forme d'injections, ou de pulvérisations dans le nez dès l'âge de 2 semaines.

Le protocole qui dépend des vaccins utilisés (il faut en général deux injections avec un rappel annuel) est à adapter en fonction des risques pour votre animal: demandez conseil à votre vétérinaire.

### **Conclusion**

La toux de chenil est une maladie complexe intéressant plus particulièrement les animaux jeunes.

Les symptômes vont d'une toux persistante bénigne à des formes graves de broncho-pneumonies.

La vaccination permet d'éviter ce genre de complications très graves. Nous vous la conseillons vivement dans les situations à risque: chenils, élevages, expositions canines.

**Vérifiez votre carnet pour savoir si votre chien est vacciné soit :** en sous cutané : Pneumodog

en intraveineuse : Nobivac BbPI

**Anne-Marie Hermand**